

Northwest Gastroenterology Clinic  
Extended Bowel Prep

## **Clínica de Gastroenterología del Noroeste Preparación Intestinal Extendida**

**Necesitará:** Además de la preparación intestinal recetada, compre lo siguiente (no se requiere receta):

- Una botella de Miralax en polvo. Necesitará al menos 5 dosis (85 gramos)
  - Tabletas orales de Dulcolax (o Bisacodilo genérico). Necesitará al menos 5 tabletas
- 

### **3 Días Antes de su Procedimiento**

#### **Por la mañana:**

- Tome una dosis de Miralax (17 gramos) mezclada con 4–8 onzas de agua
- Tome una tableta de Dulcolax (5 mg)

#### **Por la noche:**

- Tome una dosis de Miralax (17 gramos) mezclada con 4–8 onzas de agua
  - Tome una tableta de Dulcolax (5 mg)
- 

### **2 Días Antes de su Procedimiento**

#### **Por la mañana:**

- Tome una dosis de Miralax (17 gramos) mezclada con 4–8 onzas de agua
- Tome una tableta de Dulcolax (5 mg)

#### **Por la noche:**

- Tome una dosis de Miralax (17 gramos) mezclada con 4–8 onzas de agua
  - Tome una tableta de Dulcolax (5 mg)
- 

### **1 Día Antes de su Procedimiento**

#### **Por la mañana:**

- Tome una dosis de Miralax (17 gramos) mezclada con 4–8 onzas de agua
- Tome una tableta de Dulcolax (5 mg)
- Comience su dieta de líquidos claros y siga sus instrucciones de preparación